



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

POITOU - CHARENTES

Bulletin Technique n° 11 du 25 Avril 2001 - 1 page

COLZA : stade G2 à G4

Ravageurs

Les préconisations du précédent bulletin restent valables ; elles concernent les pucerons cendrés et les charançons des siliques (et non pas évidemment les charançons de la tige comme indiqué par erreur ...).

Maladies

Voir bulletin précédent.

BLE : stade 1 - 2 noeuds à dernière feuille étalée.

La végétation a peu évolué en raison des températures « froides » observées depuis 15 jours (température moyenne inférieure de 2° à la normale).

Septoriose

L'expression des symptômes a peu progressé, **les durées d'incubation** étant exceptionnellement **longues**. Cependant le **risque** reste à un niveau **élevé** et devrait s'y maintenir les prochains jours.

Rouille brune

Son développement a également été freiné par la période froide mais le risque reste à un **niveau élevé** dans les secteurs habituels où elle est très présente sur **variétés sensibles non protégées**. En Vienne et Deux-Sèvres, elle est observée surtout sur Soissons et Isengrain (sur 20 à 40 % des F4 et 0 à 25 % des F3 définitives).

*** Parcelles semées avant mi-novembre en Charente-Maritime et Charente.**

Renouveler rapidement la protection.

*** Parcelles au stade 3 noeuds à dernière feuille visible.**

En général, elles sont protégées depuis moins de trois semaines ; le renouvellement de la protection est à prévoir dans 8 à 10 jours (environ) au stade dernière feuille étalée.

Attention à ne pas réintervenir trop tardivement dans le cas d'un premier traitement précoce (piétin-feuilles) ou effectué à dose « réduite ».

*** Parcelles semées en décembre-janvier.**

- Dans les situations à bon potentiel arrivant au stade 2 noeuds, intervenir rapidement.

- Dans les situations à potentiel limité et/ou au stade 1 noeud, on s'orientera vers une application unique ultérieurement.

ORGE D'HIVER : stade

gonflement

Les symptômes d'helminthosporiose et de rhynchosporiose ont peu évolué.

Renouveler la protection.

ORGE DE PRINTEMPS :

stade redressement à épi 1 cm

Intervenir dès que possible pour contrôler la Rhynchosporiose et l'Helminthosporiose très présentes notamment sur semis précoces en Charente-Maritime.

BLE

Maladies foliaires :

Stagnation des symptômes mais risques élevés

Service Régional de la
Protection des Végétaux
13, route de la Forêt
86 580 BIARD
Tél.: 05.49.62.98.25
Fax: 05.49.62.98.26

Directeur gérant :
L. JUILLARD-CONDAT

Site internet :
www.srpv-
poitoucharentes.com
E-mail :

rpv.draf-poitou-
charentes@agriculture.gouv.fr

Publication périodique
C.P.A.P. n°2139 AD
ISSN n°02294 470

3340 J 40830

BnF
S&T

7168